

この度は、「コアカリ重点ポイント集〔改訂第 10 版〕vol.3」をご購入いただき、誠に有難うございます。

本書について、以下のとおり補足及び訂正させていただきます。

ご迷惑をお掛け致しまして申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い申し上げます。

薬学ゼミナール編集 コアカリ重点ポイント集〔改訂第 10 版〕 vol.3

補足及び訂正一覧表

	訂正前	訂正後
P129 表〈要 指導医薬品 と一般用医 薬品の比 較〉	—	下図参照
P148 表 医薬品等の 直接の容器 等の記載事 項 指定濫用防 止医薬品 例外	「要確認」	削除

p.129

	要指導医薬品		一般用医薬品			
	特定要指導医薬品		第一類 医薬品	第二類医薬品		第三類 医薬品
				指定第二 類医薬品		
年齢・薬剤使 用状況等の確 認	薬剤師に確認させなければならない			薬剤師又は登録販売者 に確認させるよう努め なければならない	なし	

下記は、2026 年 6 月 16 日炭酸リチウムの電子添文改訂（妊婦投与禁忌解除）に伴う追補となります。

	訂正前	訂正後
P529 表 精神疾患 治療薬の注意事項 炭酸リチウム	[禁忌] …… ・妊婦：催奇形性あり	[禁忌] …… (削除)
P668 表 胎児に先 天異常を起こす医薬 品	炭酸リチウム 胎児に……禁忌	(削除)

P686 問 29	炭酸リチウムは催奇形性のおそれがあるため、妊婦には禁忌である。	(削除)
P687 問 29 解答・解説	正 メトトレキサートカプセル、サリドマイド等も催奇形性のおそれがあるため、妊婦に禁忌である。	(削除)