

この度は、「回数別既出問題集 108 回薬剤師国家試験」をご購入いただき、誠に有難うございます。

本書について、以下のとおり補足及び訂正させていただきます。

ご迷惑をお掛け致しまして申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い申し上げます。

薬学ゼミナール編集 回数別既出問題集 108 回薬剤師国家試験 補足及び訂正一覧表

	訂正前	訂正後
P58 問 54 解説 4	……抗 HER2 ヒト化モノクローナル抗体であるトラスツマブと……	……抗 HER2 ヒト化モノクローナル抗体であるトラスツズマブと……
P75 問 70 解説 表 間隔尺度 例	コレステロール値 血圧	気温(℃) 西暦年
P129 問 111 選択肢 3	……共輸送により腎臓の……	……共輸送により腎臓の……
P135 問 115 選択肢 4	……コドンを含む tRNA の 3' 末端に、 mRNA の……	……コドンを含む tRNA の 3' 末端に、 mRNA の……
P137 問 116 関連問題 問 3 解説	正	誤
P182 問 151 解説 1	……曲線 A を高濃度側に <u>平行移動</u> させる。	……曲線 A を高濃度側に移動させる。
P208 問 173 解説 6 行 目	…… $=\frac{\ln 20}{\ln 4}=\ln 5=\dots\dots$	…… $=\ln\left(\frac{20}{4}\right)=\ln 5=\dots\dots$
P221 問 180 解説 2	……別に規定するもののほか、エンド シキシン試験法に適合する必要がある。 エンドシキシン試験法の適用が困難な 場合にのみ、……	……別に規定するもののほか、 <u>エンド シキシン試験法に適合する必要がある。 エンドシキシン試験法の適用が困難な場 合にのみ、……</u>
P226 問 182 解説 3	……(イブラグリフロリジン……	……(イブラグリフロジン……
P250 問 204 解説	……pH 変化による白濁が生じる……	……pH 変化による <u>配合変化</u> が生じる… …
P250 問 204 解説 5	……注射液の混合による白濁が生じる ……	……注射液の混合による <u>配合変化</u> が生 じる……
P286 問 231 解説 3	……シアン化物イオン(CN ⁻)の中毒に 用いる。	シアン及びシアン化合物による中毒に 用いる。
P286 問 231 解説 4	……シアン化物イオンの中毒に用いる。	シアン及びシアン化合物による中毒に 用いる。
P303 問 244-245 問 題	pH 7.15(基準値 7.4±0.5)……	pH 7.15(基準値 7.4±0.05)……
P308 問 248 解説 6 行目	……end-of-dose failuer……	……end-of-dose failure……
P332 問 268 解説〈代 謝阻害の様式〉CYP ヘ ム鉄への共有結合 説 明	……不可逆的で、Cs が新たに……	……不可逆的で、 <u>CYP</u> が新たに……
P333 問 269 解説	……必要に応じ減量・休薬等の処置を 行う。	……必要に応じ、 <u>投与量を調節する</u> 。

P336 問 271 解説 1	セロトニン再取り込みを阻害する……バ イオアペイラビリティは変化しない。	本患者は腎機能が低下したことによるリ チウム中毒の可能性が高い。なお、炭 酸リチウムとカルバマゼピンとの併用に より精神神経系症状があらわれたとの報 告はあるが、機序は不明である。
P336 問 271 解説 2	セロトニン再取り込みを阻害する……ク リアランスは変化しない。	本患者は腎機能が低下したことによるリ チウム中毒の可能性が高い。なお、炭 酸リチウムとカルバマゼピンとの併用に より精神神経系症状があらわれたとの報 告はあるが、機序は不明である。
P336 問 271 解説 5	……eGFR は 36.3 mL/min/1.73 m ³ (女 性の正常値:81~137 mL/min/1.73 m ³ であり、……	……eGFR は 36.3 mL/min/1.73 m ² (女 性の正常値:81~137 mL/min/1.73 m ² であり、……
P338 問 272 解説 3	レボフロキサシンは、副作用を回避する ため、ピーク値などを測定する。特に腎 機能が低下している患者では高い血中 濃度が……	レボフロキサシンには、副作用を回避す るために血中濃度をモニターする規定 はない。1日1回投与のため、高いCmax が得られ耐性菌を誘導しにくいとされて いる。しかし、腎機能の低下している患 者では高い血中濃度が……
P373 問 299 解説 5	バルプロ酸によるカルニチンの生成抑 制や再吸収抑制などにより、血中アンモ ニア値が上昇し、意識障害が起こってい る可能性が考えられる。	バルプロ酸は、カルニチン生合成酵素 を阻害するなど様々な機序でカルニチ ン欠乏症を引き起こす。カルニチンは、 長鎖脂肪酸をミトコンドリア内に輸送す るために必要な物質である。カルニチ ンの欠乏により、脂肪酸からのエネルギー 供給が滞るため、尿素サイクルの抑制や糖 新生の抑制が生じる。また、カルニチ ンが欠乏すると、バルプロ酸は肝毒性又 は尿素サイクルを阻害する物質に代謝 されるため、血中アンモニア濃度を上昇 させることがある。よって、本患者はバル プロ酸投与により、カルニチンが欠乏 し、高アンモニア血症を伴う意識障害が あらわれたと考えられる。

下記は 2024 年 4 月 1 日から食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁に移管されたことに伴う追補訂正となります。

	訂正前	訂正後
P82 問 77 選択肢 2 と解説 表	薬事・ <u>食品衛生</u> 審議会	薬事審議会
P82 問 77 関連問 題 問 1	……薬事・食品衛生審議会……	……薬事審議会……
P389 問 311 解説 2	……薬事・食品衛生審議会……	……薬事審議会……

下記は、2024 年 10 月のヘルシンキ宣言 ヘルシンキ改訂の和訳に伴う追補となります。

	訂正前	訂正後
P402 問 321 解説 1	……(人間を対象とする医学研究の倫理的原則)……	……(人間の <u>参加者を含む</u> 医学研究のための倫理的原則)……

下記は、2026 年 4 月 10 日に第十九改正日本薬局方が告示・施行されたことに伴う追補となります。

	訂正前	訂正後
P56 問 52 解説 4	……通例、耐圧性の密封容器であり、……	……通例、耐圧性の密封容器又は気密容器であり、……
P56 問 52 表 吸入エアゾール 容器	耐圧性の密封容器	耐圧性の密封容器又は気密容器
P56 問 52 関連問題 問 1 解説	……耐圧性の密封容器であり、……	……耐圧性の密封容器又は気密容器であり、…
P222 問 181 解説 1	……するものである。 <u>吸入剤から噴霧、放出される薬物量の均一性を定量的に評価するのは、吸入剤の送達量均一性試験法である。</u>	……するものである。

下記は、2026 年 4～5 月の医療法、医薬品医療機器等法の改正に伴う追補となります。

	訂正前	訂正後
P94 問 89 選択肢 1	インターネットで販売できる。	<u>全て</u> インターネットで販売できる。
P94 問 89 解説 1	要指導医薬品はインターネット販売(特定販売)してはならない。特定販売……	要指導医薬品のうち、 <u>特定要指導医薬品</u> はインターネット販売(特定販売)してはならない。 <u>他に</u> 特定販売……
P389 問 311 選択肢 4	……製薬企業に感染症定期報告を……	……製薬企業に感染症 <u>評価</u> 報告を…
P389 問 311 解説 4	……その成果を <u>定期的に</u> 厚生労働大臣に……この制度を感染症定期報告という。……	……その成果を厚生労働大臣に……この制度を感染症 <u>評価</u> 報告という。……
P392 問 313	…… <u>2 つ</u> 選べ。	…… <u>1 つ</u> 選べ。
P392 問 313 選択肢 1	1 …… <u>濫用等</u> のおそれのある医薬品を…	1 …… <u>指定濫用防止</u> 医薬品を……
P392 問 313 選択肢 4	4 <u>原則として</u> 一人一包装単位での販売となる。	4 一人一包装単位での販売となる。
P392 問 313 解説	……「 <u>濫用等</u> のおそれのある医薬品」に指定される。 <濫用等のおそれのある医薬品として指定される成分> エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェ	……「 <u>指定濫用防止</u> 医薬品」に指定される。 < <u>指定濫用防止</u> 医薬品> エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリン、 <u>ジフェン</u>

	ドリン、メチルエフェドリン	<u>ヒドラミン、デキストロメトルファン</u>
P392 問 313 解説 1	……濫用等のおそれのある医薬品に該当する。濫用等のおそれのある医薬品である場合、……	…… <u>指定濫用防止医薬品</u> に該当する。 <u>指定濫用防止医薬品</u> である場合、……
P392 問 313 解説 2	……特定販売ができる医薬品は、一般用医薬品と……	……特定販売ができる医薬品は、 <u>要指導医薬品（特定要指導医薬品を除く。）</u> 、一般用医薬品と……
P392 問 313 解説 4	適切 濫用等のおそれのある医薬品を販売する場合、原則として 1 人 1 包装での販売となる。	4 <u>不適切 購入者が 18 歳以上の者であれば、複数個購入することができる。この場合、複数個購入する理由を確認するとともに、適正な使用が確保できることを確認する必要がある。</u>
P392 問 313 解答	1、4	1
P403 問 322 解説 1	保険薬局は、保険医療機関と……	保険薬局は、保険医療機関・ <u>オンライン診療受診施設</u> と……
P403 問 322 解説 2	保険薬局は、保険医療機関と……	保険薬局は、保険医療機関・ <u>オンライン診療受診施設</u> と……

下記は、2026 年 10 月 1 日に「社会保険診療報酬支払基金」から「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に名称変更することに伴う追補となります。

	訂正前	訂正後
P82 問 77 選択肢 5 及び解説表	社会保険診療報酬支払基金	<u>医療情報基盤・診療報酬審査支払機構</u>